

農藥延伸使用範圍之群組化作物或有害生物種類、代表性使用範圍及其實施方式-附表

(107.01.17)

附表一 化學農藥殺菌劑及殺線蟲劑藥效試驗作物分群表

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
1.水稻	水稻	胡麻葉枯病 (<i>Cochliobolus miyabeanus</i> , 無性世代: <i>Bipolaris oryzae</i>)	禾本科作物	胡麻葉枯病 (<i>Bipolaris zizaniae</i>)		
		白葉枯病 (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i>)	禾本科作物	細菌性條斑病 (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>) 等葉部細菌性病害		
		稻熱病 (<i>Pyricularia oryzae</i>)	禾本科作物	稻熱病 (<i>Pyricularia</i> spp.)		
2.雜糧	玉米	露菌病 (<i>Peronosclerospora sacchari</i>)	禾本科作物	露菌病 (<i>Peronosclerospora sacchari</i>)		
	玉米	銹病 (<i>Puccinia sorghi</i> , <i>P. polysora</i>)	禾本科作物 豆科作物	銹病 (<i>Puccinia</i> spp.)		
	玉米	葉斑病 (胡麻葉枯病) (<i>Cochliobolus heterostrophus</i> , 無性世代 <i>Bipolaris maydis</i>)	禾本科作物	葉斑病 (<i>Bipolaris sorghicola</i> , <i>B. coicis</i> , <i>B. setariae</i>) 煤紋病(<i>Trichometasphaeria turcica</i> , <i>Bipolaris turcicum</i>)		
	玉米	紋枯病 (<i>Thanatephorus cucumeris</i> , 無性世代: <i>Rhizoctonia solani</i>)	禾本科作物 豆科作物 薑	立枯病 (<i>Rhizoctonia solani</i>)		
	落花生	冠腐病 (<i>Aspergillus niger</i>)	禾本科作物 豆科作物	苗枯病 (<i>Aspergillus flavus</i>)		
3.蔬菜	蔬菜任選1種	苗期病害	水稻	與代表害物相同之苗期病害		
			蔬菜			
	葫蘆科作物 任選一種	病害 (Diseases)	白粉病 (Powdery mildews)	葫蘆科作物	與代表害物相同之病害 (Diseases)	
茄科作物、錦葵科作物						
豆科作物 菊科作物、繖形花科作物						

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
			草莓、胡麻、板藍根			
	蔥、韭、蒜任選1種	病害 (Diseases)	蔥科作物 金針、百合	與代表害物相同之病害 (Diseases)		
	豆科作物作物任選1種	病害 (Diseases)	豆科作物	與代表害物相同之病害 (Diseases)		
	十字花科蔬菜或萵苣任選1種	露菌病 (Downy mildews)	十字花科作物、菊科作物、 莧科作物、旋花科作物、唇形花科作物、菠菜 蔥科作物 豆科作物 葫蘆科作物	露菌病 (Downy mildews)、白銹病 (<i>Albugo</i> spp.)		
	十字花科蔬菜或萵苣或蔥任選1種	黑斑病或紫斑病或葉斑病 (Alternaria leaf spot, Black leaf spot, Brown rot)	十字花科作物、菊科作物、 山蘇、繖形花科作物 蔥科作物 茄科作物 豆科作物 地黃、當歸	黑斑病、紫斑病、葉斑病、早疫病 (Alternaria leaf spot, Black leaf spot, Brown rot, early blight))		
	番椒(甜椒、辣椒)或番茄或茄子或草莓或馬鈴薯	疫病 (<i>Phytophthora</i> spp.)或晚疫病 (<i>Phytophthora infestans</i>)	菊科作物、莧科作物、唇形花科作物、甜菜、香椿 蔥科作物 茄科作物、金針、洛神葵、秋葵 豆科作物 葫蘆科作物 胡麻 芋、薑、甘藷 草莓	疫病、晚疫病 (<i>Phytophthora infestans</i>)、草莓果腐病 (<i>Phytophthora</i> spp.)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
	番茄或蔥或茄子或番椒(甜椒、辣椒)或胡蘿蔔	白絹病 (Southern blight)	地黃、丹參、黃耆、當歸	白絹病 (Southern blight)		
			禾本科作物			
			蔥科作物、山蘇、唇形花科作物			
			茄科作物			
			豆科作物			
			胡蘿蔔、牛蒡、芋、菱角、薑、山藥、甜菜、百合、甘藷			
	向日葵、胡麻					
	地黃、魚腥草、紫草、澤瀉、薑黃					
	番椒(甜椒、辣椒)或西瓜或草莓	炭疽病 (<i>Colletotrichum</i> spp.)	十字花科作物、菊科作物、菠菜、龍骨瓣芥菜、山蘇、旋花科作物、莧科作物、繖形花科作物	炭疽病 (<i>Colletotrichum</i> spp.)		
			蔥科作物			
茄科作物、洛神葵						
豆科作物						
葫蘆科作物						
菱角、山藥、當歸						
草莓						
金線連						
草莓	灰黴病(<i>Botrytis</i> spp., 有性世代: <i>Botryotinia</i> spp.)	芥藍、蕓菜、香椿、芹菜	灰黴病 (<i>Botrytis</i> spp., 有性世代: <i>Botryotinia</i> spp.)			
		蘆筍				
		蔥科作物、百合科作物				
		茄科作物、洛神葵、秋葵				

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
			豆科作物、菊科作物			
			蕎麥			
			黃麻 (圓果種)、鐘麻、亞麻、蓖麻等作物			
	蘆筍	莖枯病 (Stem blight)	茄科作物	莖枯病 (Stem blight)		
			山葵			
	萵苣	菌核病 (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	十字花科作物、菊科作物、繖形花科作物、蕓菜、菠菜、萵菜、野萵、馬齒莧、山蘇、唇形花科作物	菌核病 (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)		
			蔥科作物			
			豆科作物			
			茄科作物、秋葵、胡瓜			
			樹薯、甘藷、甜菜、百合、丹參			
十字花科蔬菜或茄科蔬菜任選1種		細菌性病害 (Bacterial diseases)	十字花科作物、菊科作物、繖形花科作物、葫蘆科作物	與代表害物相同之細菌性病害 (Bacterial diseases)		
			蔥科作物			
			豆科作物			
			茄科作物、秋葵			
			草莓			
			胡麻			
番茄或西瓜		根瘤線蟲(<i>Meloidogyne</i> spp.)	十字花科作物、菊科作物、藜科作物、旋花科作物、馬齒莧	地下部線蟲類 根瘤線蟲 (<i>Meloidogyne</i> spp.) 根腐線蟲 (<i>Pratylenchus</i> spp.) 螺旋線蟲(<i>Helicotylenchus</i> spp.) 腎形線蟲(<i>Rotylenchulus</i> spp.)等		
			蔥科作物			
			豆科作物			
			豆科作物			

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
			茄科作物	地下部線蟲類。		
			葫蘆科作物			
			薑科作物、芋、樹薯、山藥、胡蘿蔔、當歸、丹參、草莓、仙草			
	草莓或水稻	葉芽線蟲、線蟲白尖病 (<i>Aphelenchoides besseyi</i>)	禾本科作物	葉芽線蟲、線蟲白尖病 (<i>Aphelenchoides besseyi</i>)		
			蔥科作物、山蘇、過溝菜蕨			
			百合科作物			
			草莓			
4.果樹	梨	黑星病 (<i>Venturia spp.</i>)	薔薇科果樹	黑星病 (<i>Venturia spp.</i>)		香蕉及柑桔黑星病菌分別為 <i>Guignardia musae</i> 及 <i>Guignardia citricarpa</i> 。
	葡萄或椪果或木瓜	白粉病 (Powdery mildews)	薔薇科果樹、棗(台灣蜜棗、印度棗)、柿	白粉病 (Powdery mildews)		
			椪果、木瓜、獼猴桃、黃金果、桑			
柑桔類						
木瓜或番荔枝或蓮霧	疫病 (<i>Phytophthora spp.</i>)		木瓜、番荔枝、椪果、鳳梨、荔枝、龍眼、紅毛丹、百香果、酪梨	疫病 (<i>Phytophthora spp.</i>)、露疫病 (<i>Peronophythora litchii</i>)、鳳梨心腐病 (<i>Phytophthora sp.</i>)	「地上部及果實疫」與「根部及地下部疫」應各別進	
			棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗、枇杷			
			柑桔類			

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
			蓮霧、番石榴、無花果 可可		行試驗。	
	檬果	炭疽病 (<i>Colletotrichum</i> spp.)	無患子科作物、木瓜、香蕉、番荔枝、百香果、酪梨、紅龍果、椰子、檳榔、橄欖、楊梅 葡萄 (晚腐病)、桃金娘科作物、楊桃、桑科作物、藍莓 薔薇科果樹、柿、棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗 柑桔類 山茶科作物 (赤葉枯病) 咖啡、可可	炭疽病、葡萄晚腐病、茶赤葉枯病 (<i>Colletotrichum</i> spp.)、木瓜褐斑病(<i>Corynespora cassicola</i>)		
	葡萄	銹病 (Rusts)	薔薇科果樹、棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗、番荔枝 荔枝、龍眼 咖啡 無花果	銹病 (Rusts)		
	梨	黑斑病(<i>Alternaria</i> sp.)	木瓜、香蕉、葡萄、百香果、薔薇科果樹、山茶科作物、柑桔類	葉斑病、褐斑病(<i>Alternaria</i> sp.)		
	梨	白紋羽病 (<i>Rosellinia necatrix</i>)	果樹、山茶科作物及其他樹種	白紋羽病 (<i>Rosellinia necatrix</i>)		
	葡萄	褐根病 (<i>Phellinus noxius</i>)	果樹、山茶科作物、咖啡及其他樹種	褐根病、立枯病 (<i>Phellinus noxius</i>)		
	柿	灰黴病(<i>Botrytis</i> spp., 有性世代: <i>Botryotinia</i> spp.)	薔薇科果樹 楊桃、葡萄、桑	灰黴病(<i>Botrytis</i> spp., 有性世代: <i>Botryotinia</i> spp.)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
	椪果或柑桔類	細菌性病害 (Bacterial diseases)	柑桔類	與代表害物相同之細菌性病害 (Bacterial diseases)	「地上部細菌性病害」與「地下部細菌性病害」應各別進行試驗。	
			百香果、石榴、山茶科作物			
			椪果、木瓜、鳳梨、香蕉			
			薔薇科果樹			
			柑桔類			
			楊桃			
6.花卉	花卉或蔬菜任選1種	病害 (Diseases)	花卉	與代表害物相同之病害 (Diseases)		
7.林木	林木或果樹任選1種	病害 (Diseases)	林木	與代表害物相同之病害 (Diseases)		
8.菇 (註3)	洋菇或相同栽培方式之菇類任選1種	腫柄病/褐痘病 (<i>Mycogone perniciosa</i>)	床式栽培菇類	褐斑病 (<i>Verticillium fungicola</i> = <i>Lecanicillium fungicola</i>)、菌床綠黴病 (<i>Gliocladium</i> sp.)		1. 床式栽培菇類: 洋菇屬菇類、草菇等 (註4)。
		綠黴病 (<i>Trichoderma</i> spp.)	床式栽培菇類、太空包/瓶式及段木栽培菇類	<i>Trichoderma harzianum</i>		
		白黴病 (<i>Cladobotryum variospermum</i>)	床式栽培菇類	<i>Cladobotryum dendroides</i>		
		菌核病	床式栽培菇類	草菇白絹病 (<i>Sclerotinia rolfsii</i>)		
		細菌性病害 (Bacterial diseases)	床式栽培菇類	褐菇病 (<i>Pseudomonas tolaasii</i>)、歪頭病 (<i>Pseudomonas</i> sp.)		
	香菇或相同栽培方式之菇類	紅色麵包黴菌 (<i>Neurospora</i> spp.)	太空包/瓶式栽培菇類	無性世代 (<i>Monilia</i> spp.)		2. 太空包/瓶式及段木栽培菇類: 香菇、蠔菇(側耳)屬菇類、木耳屬

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物 (註 1)	作物 (註 2)	同群組害物 (註 1)		
	任選 1 種					菇類等
	杏鮑菇或相同栽培方式之菇類任選 1 種	細菌性病害 (Bacterial diseases)	太空包/瓶式栽培菇類	細菌性腐敗病 (<i>Burkholderia gladioli</i>)、細菌性畸腐病 (<i>Pantoea</i> sp.)、金針菇黑腐病 (<i>Pseudomonas tolaasii</i>)		(註 4)。

註 1：代表害物可延伸害物均以病名加註病原菌學名或通稱表示。

註 2：各科作物種類說明如下：

- 禾本科作物：【禾本科雜糧類：玉米、高粱、小米、薏苡】、【禾本科根菜類：茭白、竹筍】、【水稻】、【小麥】、【狼尾草】、【甘蔗】、【竹】等
- 十字花科作物：【十字花科包葉菜類：結球白菜、甘藍、花椰菜、青花菜】、【十字花科小葉菜類：不結球白菜、芥藍、芥菜、油菜】、【十字花科根菜類：蘿蔔、蕪菁、山葵】、【油菜(籽)】等
- 茄科作物：【茄科果菜類：番茄、茄子、番椒 (甜椒、辣椒)、枸杞、香瓜茄、樹番茄】、【茄科小葉菜類：龍葵、枸杞】、【馬鈴薯】、【菸草】等
- 菊科作物：【菊科小葉菜類：不結球及半結球萵苣、茼蒿、山萵蒿 (昭和草)、紅鳳菜、白鳳菜、艾草】、【結球萵苣】、【牛蒡】、【風茹】、【杭菊】、【向日葵】等
- 豆科作物：【豆科乾豆類、豆菜類：大豆 (黃豆、黑豆、毛豆)、豌豆、菜豆 (含粉豆、醜豆、四季豆)、豇豆 (含長豇豆)、菜豆、蠶豆、扁豆、翼豆、落花生、紅豆、綠豆、花豆、樹豆、刀豆】、【豆科根菜類：闊葉大豆 (一條根)、通天草 (狗尾草)、豆薯】、【葉用豌豆】、【黃耆】等
- 葫蘆科作物：【瓜菜類：胡瓜、苦瓜、絲瓜、南瓜、夏南瓜、隼人瓜、冬瓜、越瓜、扁蒲、木鱉果】、【瓜果類：甜瓜 (洋香瓜、香瓜)、西瓜】、【龍鬚菜】等
- 蔥科作物：【蔥科小葉菜類：蔥 (麥蔥、蝦夷蔥、珠蔥)、韭、蒜】、【蔥科根菜類：洋蔥、落葵、蒜】等
- 繖形花科：【繖形花科小葉菜類：芹菜、茴香、水芹菜、山芹菜、芫荽】、【胡蘿蔔】、【當歸】等
- 旋花科作物：【旋花科小葉菜類：蕪菁、葉用甘藷】、【甘藷】等
- 唇形花科作物：【唇形花科小葉菜類：仙草、薄荷、羅勒、紫蘇】、【丹參】等

薑科作物：【薑】、【薑荷花】、【薑黃】等。

莧科作物：【莧菜 (紅莧菜、白莧菜)】等。

藜科作物：【藜科小葉菜類：菠菜、萵菜 (甜菜)】、【台灣藜】、【萵菜 (甜菜根)】等。

錦葵科作物：【錦葵科果菜類：秋葵、洛神葵】等。

百合科作物：【百合科根菜類：百合、金針 (碧玉筍)】、【金針】等。

薔薇科果樹：【薔薇科梨果類：梨、蘋果、桃、梅、李、枇杷】等。

柑桔類作物：【桶柑、椪柑、海梨柑、茂谷柑、柳丁、臍橙、檸檬、萊姆、葡萄柚、文旦柚、柚子、白柚、西施柚、金桔、金柑】等。

山茶科作物：【茶】、【油茶】、【山茶】等。

桑科作物：【桑科小漿果類：桑、無花果】、【桑科大漿果類：波羅蜜、榴槤蜜、麵包果】等。

無患子科作物：【無患子科核果類：荔枝、龍眼】、【紅毛丹】、【臺灣欒樹】等。

桃金娘科作物：【桃金娘科小漿果類：蓮霧、番石榴、嘉寶果】等。

註 3：各科菇類種類：【洋菇屬菇類：洋菇、高溫洋菇、褐色蘑菇、波特菇、巴西蘑菇等】、【蠔菇 (側耳) 屬菇類：杏鮑菇、秀珍菇、蠔菇、珊瑚菇等】。

註 4：床式栽培菇類：洋菇屬菇類、草菇等。太空包/瓶式及段木栽培菇類：香菇、蠔菇 (側耳) 屬菇類、木耳屬菇類等。

附表二 化學農藥殺蟲劑與殺蟎劑藥效試驗作物分群表

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
1.水稻	水稻	二化螟 (<i>Chilo suppressalis</i>) 或瘤野螟 (<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>)	禾本科作物	1. 螟蛾類： 三化螟 (<i>Scirpophaga incertulas</i>) 二化螟 (<i>Chilo suppressalis</i>) 黃螟 (<i>Tetramoera schistaceana</i>) 條螟 (<i>Proceras venosatus</i>) 白螟 (<i>Scirpophaga novella</i>) 二點螟 (<i>Chilo traea infuscatella</i>) 2. 夜蛾類： 大螟 (<i>Sesamia inferens</i>) 臺灣夜盜 (<i>Spodoptera mauritia</i>) 稻螟蛉 (<i>Naranga aenescens</i>) 粟夜盜蛾 (<i>Leucania separate</i>) 3. 稻苞蟲 (<i>Parnara guttata</i>) 稻心蠅 (<i>Hydrellia philippina</i>) 樹蔭蝶 (<i>Melanitis leda</i>)		
	水稻	水象鼻蟲 (<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>)	水稻	稻象鼻蟲 (<i>Echinocnemus squameus</i>) 鐵甲蟲 (<i>Dicladispa armigera</i>) 負泥蟲 (<i>Oulema oryzae</i>)		
	水稻	褐飛蝨 (<i>Nilaparvata lugens</i>)	水稻	1. 稻蝨類： 褐飛蝨 (<i>Nilaparvata lugens</i>) 斑飛蝨 (<i>Laodelphax striatellus</i>) 白背飛蝨 (<i>Sogatella furcifera</i>) 2. 椿象類： 黑椿象 (<i>Scotinophara lurida</i>) 南方綠椿象 (<i>Nezara viridula</i>) 3. 薊馬類： 稻薊馬 (<i>Stenchaetothrips biformis</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
				稻管薊馬 (<i>Haplothrips aculeatus</i>)		
			茭白	長綠飛蝨 (<i>Saccharosydne procerus</i>)		
	水稻	黑尾葉蟬任選 1 種 (<i>Nephotettix</i> spp.)	水稻	1. 葉蟬類： 偽黑尾葉蟬 (<i>Nephotettix cincticeps</i>) 黑條黑尾葉蟬(<i>Nephotettix nigropictus</i>) 臺灣黑尾葉蟬 (<i>Nephotettix virescens</i>) 電光葉蟬 (<i>Recilia dorsalis</i>) 白翅葉蟬 (<i>Thaia rubiginosa</i>) 2. 椿象類： 黑椿象 (<i>Scotinophara lurida</i>) 南方綠椿象(<i>Nezara viridula</i>) 3. 薊馬類： 稻薊馬 (<i>Stenchaetothrips biformis</i>) 稻管薊馬 (<i>Haplothrips aculeatus</i>)		
2.雜糧	玉米或高粱或大豆	蚜蟲類任選 1 種	禾本科作物 大豆	蚜蟲類		
	玉米	玉米螟 (<i>Ostrinia furnacalis</i>)	禾本科作物 薑	1. 螟蛾類： 玉米螟 (<i>Ostrinia furnacalis</i>) 2. 夜蛾類： 番茄夜蛾 (<i>Helicoverpa armigera</i>) 3. 毒蛾類 (Tussock moths)		
	落花生或大豆	夜蛾類或毒蛾類 (Noctuid moths, Tussock moths)	豆科作物 禾本科作物	1. 夜蛾類： 斜紋夜蛾 (<i>Spodoptera litura</i>) 甜菜夜蛾 (<i>Spodoptera exigua</i>) 番茄夜蛾 (<i>Helicoverpa armigera</i>) 銀紋夜蛾 (<i>Trichoplusia ni</i>) 2. 毒蛾類： 小白紋毒蛾 (<i>Orgyia postica</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
				臺灣黃毒蛾 (<i>Euproctis taiwana</i>) 3. 天蛾類： 條紋天蛾 (<i>Hippotion celerio</i>) 蝦殼天蛾 (<i>Agrius convolvuli</i>) 4. 螟蛾類： 豆莢螟 (<i>Maruca vitrata</i>) 白緣螟蛾 (<i>Etiella zinckenella</i>)		
	大豆	根潛蠅 (<i>Ophiomyia centrosematis</i>) 或莖潛蠅 (<i>Melanagromyza sojae</i>) 或斑潛蠅類 (<i>Liriomyza</i> sp.)	豆科作物	潛蠅類： 根潛蠅 (<i>Ophiomyia centrosematis</i>) 莖潛蠅 (<i>Melanagromyza sojae</i>) 斑潛蠅類 (<i>Liriomyza</i> sp.)		
	大豆或落花生	小綠葉蟬 (<i>Edwardsiana flavescens</i>)	豆科作物、茄子 秋葵	小綠葉蟬 (<i>Edwardsiana flavescens</i>)		
	大豆	豆莢螟 (<i>Maruca vitrata</i>)	豆科作物 胡麻	豆莢螟 (<i>Maruca vitrata</i>) 豆莢斑螟 (<i>Etiella behrii</i>)		
3. 蔬菜	甘藍 或 蔥 或	小菜蛾 (<i>Plutella xylostella</i>) 或紋白蝶 (<i>Artogeia canidia sordid</i> , <i>A. rapae crucivora</i>) 或斜紋夜蛾 (<i>Spodoptera litura</i>) 或甜菜夜蛾 (<i>Spodoptera exigua</i>) 或	十字花科作物、菊科作物、葉用甘藷、蕓菜、芹菜、菠菜、洛葵、唇形花科作物、龍骨瓣蒼菜、過溝菜蕨、山蘇、莧菜、芫荽、香椿等 蔥科作物	1. 夜蛾類： 斜紋夜蛾 (<i>Spodoptera litura</i>) 甜菜夜蛾 (<i>Spodoptera exigua</i>) 番茄夜蛾 (<i>Helicoverpa armigera</i>) 銀紋夜蛾 (<i>Trichoplusia ni</i>) 球菜夜蛾 (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>) 2. 毒蛾類 (Tussock moths) 3. 植食性瓢蟲類及金花蟲類		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
番茄	番茄夜蛾 (<i>Helicoverpa armigera</i>)	葫蘆科作物	(Phytophagous species of ladybird beetle and leaf beetle) 4. 紋白蝶 (<i>Artogeia canidia sordida</i> , <i>A. rapae crucivora</i>) 菜心螟 (<i>Hellulla undalis</i>) 大菜螟 (<i>Crocidolomia binotalis</i>) 甘藷鳥羽蛾 (<i>Ochyrotica concursa</i>) 白鳥羽蛾 (<i>Alucita niveodactyla</i>) 蝦殼天蛾 (<i>Agrius convolvuli</i>) 條紋天蛾 (<i>Hippotion celerio</i>) 褐帶紋水螟蛾 (<i>Parapoynx crisonali</i>) 優美蘭葉蜂(<i>Senoclidea decorus</i>) 芝麻莢野螟(<i>Antigastra catalaunalis</i>) 甜菜白帶野螟蛾(<i>Spoladea recurvalis</i>) 竹涓夜蛾(<i>Rivula biatomea</i>)			
		豆科作物				
		茄科作物、金針、洛神葵、秋葵				
胡蘿蔔、蘿蔔、馬鈴薯、甘藷、牛蒡、蘆筍、山藥、山葵、芋、菱角、蓮、薑、薑黃、竹						
胡麻						
草莓						
丹參、當歸、紫蘇						
丹參、當歸、紫蘇						
甘藍或芥藍	菜心螟 (<i>Hellulla undalis</i>) 或大菜螟 (<i>Crocidolomia binotalis</i>)	十字花科作物、葉用甘藷、過溝菜蕨、山蘇	菜心螟 (<i>Hellulla undalis</i>) 大菜螟 (<i>Crocidolomia binotalis</i>) 大螟 (<i>Sesamia inferens</i>) 二化螟 (<i>Chilo suppressalis</i>) 瓜螟 (<i>Diaphania indica</i>) 竹捲葉螟 (<i>Coclebotys coclesalis</i>) 甘藷螟蛾 (<i>Omphisa anastomosalis</i>) 茄螟 (<i>Leucinodes orbonalis</i>) 瘤野螟 (<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>) 褐帶紋水螟蛾(<i>Parapoynx crisonali</i>)			
十字花科作物 任選 1 種	球菜夜蛾 (切根蟲) (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis</i>)	十字花科作物、菊科作物	1. 金龜子類幼蟲 (疍蟥) (<i>Scarabaeidae</i>) 2. 象鼻蟲類：			
		蔥科作物				

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
		<i>segetum</i>)	茄科作物 馬鈴薯、薑、甘藷、芋、竹 玉米、高粱 豆科作物、胡麻 當歸、草莓	甘藷蟻象 (<i>Cylas formicarius</i>) 棉長鬚象鼻蟲 (長角象鼻蟲) (<i>Araecerus fasciculatus</i>) 臺灣大象鼻蟲 (<i>Rhynchophorus longimanus</i>) 粗糙象鼻蟲 (<i>Blosyrus herthus</i>) 3. 紫跳蟲 (<i>Hypogastura</i> sp.)		
	十字花科作物 任選 1 種	黃條葉蚤 (<i>Phyllotreta striolata</i>)	十字花科作物、葉用甘藷、蕓 菜、菊科作物、蔥科作物 玉米、高粱 豆科作物 茄科作物、胡麻 葫蘆科作物 蘆筍、芋、竹、甘藷、菱角、 丹參、當歸、薑 草莓	1. 金花蟲類 小猿葉蟲 (<i>Phaedon brassicae</i>) 四紋龜葉蟲 (<i>Lacoptera quadrimaculata bahemani</i>) 甘藷猿葉蟲 (<i>Corasposoma dauricum</i>) 甘藷綠背金花蟲 (<i>Metriona circumdata</i>) 黃守瓜 (<i>Aulacophora femoralis</i>) 黑守瓜 (<i>Aulacophora nigripennis</i>) 蘆筍東方金花蟲 (<i>Crioceris orientalis</i>) 蕓菜小金花蟲 (<i>Chaetocnema confinis</i>) 菱角金花蟲 (<i>Galerucella nipponensis</i>) 栗鱗斑猿金花蟲 (<i>Pachnephorus lewisii</i>) 2. 象鼻蟲類： 甘藷蟻象 (<i>Cylas formicarius</i>) 棉長鬚象鼻蟲 (長角象鼻蟲) (<i>Araecerus fasciculatus</i>) 臺灣大象鼻蟲 (<i>Rhynchophorus longimanus</i>) 粗糙象鼻蟲 (<i>Blosyrus herthus</i>) 3. 植食性瓢蟲類		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
				4. 金龜子類幼蟲 (蟻螬) (Scarabaeidae) 5. 紫跳蟲 (<i>Hypogastura</i> sp.)		
3. 蔬菜	山藥或甘藷	椿象任選 1 種	葫蘆科作物、杭菊、甘藷 (含葉用甘藷)	椿象類： 甘藷黑跳盲椿 (<i>Halticus tibialis</i>) 竹盲椿象 (<i>Mecistoscelis scirtetoides</i>) 菜椿象 (<i>Eurydema pulchrum</i>) 長角緣椿象 (<i>Notobius meleagris</i>) 扁腳緣椿象 (<i>Leptoglossus gonagra</i>) 山藥黑椿象 (<i>Harpedona marginata Distant</i>) 姬長椿象 (<i>Nysius plebejus</i>) 菸盲椿象 (<i>Nesidiocoris tenuis</i>) 墨里尼方翅網椿 (<i>Corythucha morrilli</i>)		
			茄科作物			
			蘿蔔、山藥、竹			
胡麻						
十字花科作物、豆科作物、胡瓜、茄科作物任選 1 種		蚜蟲任選 1 種	十字花科作物、菊科作物、葉用甘藷、蕹菜、菠菜、芹菜、羅勒	蚜蟲類： 棉蚜 (<i>Aphis gossypii</i>) 桃蚜 (<i>Myzus persicae</i>) 光褐菊蚜 (<i>Macrosiphoniella sanborni</i>) 竹葉扁蚜 (<i>Astegopteryx bambusifoliae</i>) 豆蚜 (<i>Aphis craccivora</i>) 芹菜粉蚜 (<i>Semiaphis heraclei</i>) 芹菜蚜 (<i>Aphis spiraeicola</i>) 竹莖扁蚜 (<i>Pseudoregma bambusicola</i>) 白尾紅火蚜 (<i>Dactynotus formosana</i>)		
			蔥科作物、茄科作物、金針、洛神葵、秋葵			
			牛蒡、竹、芋			
			當歸、丹參、紫蘇、草莓			
			葫蘆科作物			
			豆科作物			
			胡麻			
番茄、茄子、毛豆、豇豆、胡瓜、甜瓜任選一種		粉蟲類任選 1 種	茄科作物、秋葵、洛神葵	粉蟲類： 銀葉粉蟲 (<i>Bemisia argentifolii</i>) 螺旋粉蟲 (<i>Aleurodicus dispersus</i>) 溫室粉蟲 (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) 菸草粉蟲 (<i>Bemisia tabaci</i>)		
			十字花科作物、菊科作物、菠菜、葉用甘藷、蕹菜			
			胡麻			
			豆科作物			

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
茄子、豌豆、 或葫蘆科作物 任選一種	薊馬任選 1 種	葫蘆科作物	茄科作物、秋葵、洛神葵、金針、玉米	薊馬類： 南黃薊馬 (<i>Thrips palmi</i>) 小黃薊馬 (<i>Scirtothrips dorsalis</i>) 蔥薊馬 (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman) 豆花薊馬 (<i>Megalurothrips ustitatus</i>) 臺灣花薊馬 (<i>Frankliniella intonsa</i>) 玉米薊馬 (<i>F. williams</i>)		
		葫蘆科作物、莧科作物、臺灣藜	蔥科作物、菊科作物、十字花科作物			
		豆科作物	蘆筍、山藥、蓮			
番茄、豆科作物、甘藍、芥菜、萵苣、甜瓜、西瓜任選 1 種	斑潛蠅任選 1 種	葫蘆科作物	茄科作物	斑潛蠅類： 蔬菜斑潛蠅 (<i>Liriomyza sativae</i>) 非洲菊斑潛蠅 (<i>Liriomyza trifolii</i>) 番茄斑潛蠅 (<i>Liriomyza bryoniae</i>) 南美斑潛蠅 (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)		
		豆科作物	豆科作物			
		蘿藦、牛蒡	胡麻			
甜椒	粉介殼蟲類	葫蘆科作物	茄科作物	粉介殼蟲類： 柑桔粉介殼蟲 (<i>Planococcus citri</i>) 太平洋臀紋粉介殼蟲 (<i>Planococcus minor</i>) 絲粉介殼蟲 (<i>Ferrisia virgata</i>) 石蒜棉粉介殼蟲 (<i>Phenacoccus solani</i>) 木瓜秀粉介殼蟲 (<i>Paracoccus marginatus</i>) 長尾粉介殼蟲 (<i>Asplenium nidus</i>)		
		葫蘆科作物	長豇豆			
		葫蘆科作物	秋葵、洛神葵			
			山蘇、芋、甘藷、山藥、丹參			

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
				美地綿粉介殼蟲 (<i>Phenacoccus madeirensis</i>)		
	茄子、草莓、葫蘆科作物、豆科作物任選一種	二點葉蟎 (<i>Tetranychus urticae</i>)、神澤氏葉蟎 (<i>Tetranychus kanzawai</i>)、偽二點葉蟎 (<i>Tetranychus truncatus</i>)、赤葉蟎 (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) 任選 1 種	茄科作物、錦葵科作物、金針	1. 葉蟎類： 二點葉蟎 (<i>Tetranychus urticae</i>) 赤葉蟎 (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) 神澤氏葉蟎 (<i>Tetranychus kanzawai</i>) 皮氏葉蟎 (<i>Tetranychus piercei</i>) 偽二點葉蟎 (<i>Tetranychus truncatus</i>) 2. 偽葉蟎類： 卵圓偽葉蟎 (<i>Brevipalpus obovatus</i>) 3. 銹蟎類： 番茄銹蟎 (<i>Aculops lycopersici</i>) 4. 瘿蟎類 枸杞瘿蟎 (<i>Eriophyes tjyingi</i>) 番茄刺皮瘿蟎 (<i>Lops lycopersici</i>)		
			菊科作物、蕹菜、莧菜、紫蘇、羅勒、仙草、藜科作物、芹菜			
			馬鈴薯、甘藷、樹薯、山藥、蓮、芋			
			草莓、蔥			
			玉米			
			當歸、丹參			
			葫蘆科作物			
			豆科作物			
	蒜、韭或蔥	羅賓根蟎 (<i>Rhizoglyphus robini</i>) 或長毛根蟎 (<i>R. setosus</i>) 任選一種	蔥科作物 金針 山藥、百合	根蟎類： 羅賓根蟎 (<i>Rhizoglyphus robini</i>)、長毛根蟎 (<i>R. setosus</i>) 及廣嗜蟎屬等根蟎。		
茄科作物任選 1 種	側多食細蟎 (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	茄科作物、葫蘆科作物	細蟎類 (<i>Polyphagotarsonemus</i> spp.)			
		豆科作物				
		馬鈴薯、山藥、丹參				
		草莓				
葫蘆科作物	瓜實蠅 (Tephritids)	葫蘆科作物	瓜實蠅 (<i>Bactrocera cucurbitae</i>) 南瓜實蠅 (<i>Bactrocera tau</i>) 茄實蠅 (<i>Bactrocera latifrons</i>)			
茄科作物						
4. 果樹	柑桔類	星天牛 (<i>Anoplophora malasiaca</i> , <i>Anoplophora</i>	梨、桃、枇杷、棗(台灣蜜棗、印度棗)	天牛類： 星天牛 (<i>Anoplophora macularia</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
		<i>macularia</i>)	荔枝、百香果、榴槿蜜	桑天牛 (<i>Apriona rugicollis</i>)		
			葡萄、楊桃、桑	褐翅星斑天牛 (<i>Mesosa perplexa</i>)		
			茶、木麻黃			
	楊桃	花姬捲葉蛾 (<i>Cydia notanthes</i>) 或粗腳姬捲葉蛾 (<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>)	葡萄、蓮霧、楊桃	1. 捲葉蛾類： 花姬捲葉蛾 (<i>Cydia notanthes</i>) 粗腳姬捲葉蛾 (<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>) 葡萄捲葉蛾 (<i>Sparganothis pilleriana</i>) 三角新捲葉蛾 (<i>Statherotis leucaspis</i>) 圓紋捲葉蛾等 (<i>Platyepplus mormopa</i>)		
		梨、蘋果、桃、李	2. 桃折心蟲 (<i>Grapholita molesta</i>) 梨雲翅斑螟蛾 (<i>Numonia pirivorella</i>) 番荔枝斑螟蛾 (<i>Anonaepestis bengalella</i>)			
		柑桔類				
		番荔枝、荔枝、龍眼				
荔枝	荔枝細蛾 (<i>Conopomorpha sinensis</i>)	檬果、龍眼、百香果、荔枝、蓮霧	檬果細蛾 (<i>Acrocercops astaurota</i>) 柿蒂蛾 (<i>Kakivoria flavofasciata</i>) 桃折心蟲 (<i>Grapholita molesta</i>) 荔枝細蛾 (<i>Conopomorpha sinensis</i>) 柑桔潛葉蛾 (<i>Phyllocnistis citrella</i>)			
		桃、柿	咖啡木蠹蛾 (<i>Zeuzera coffeae</i>) 咖啡果小蠹 (<i>Hypothenemus hampei</i>) 米爾頓絨小蜂 (<i>Anselnella miltoni</i>)			
		柑桔類	瘿蚧類： 檬果瘿蚧 (<i>Procontarinia mangicola</i>) 檬果壯缺普瘿蚧 (<i>Procontarinia robusta</i>) 荔枝瘿蚧 (<i>Litchiomyia chinensis</i>)			
		山茶科作物				
		咖啡、檳榔				
葡萄、柿、枇杷、棗(台灣蜜)	斜紋夜蛾 (<i>Spodoptera litura</i>)、小白紋毒蛾	薔薇科果樹、棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗及柿	1. 毒蛾類： 小白紋毒蛾 (<i>Orgyia postica</i>)			

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
棗、印度棗)任選 1 種	(Orgyia postica)、臺灣黃毒蛾 (Euproctis taiwana) 任選 1 種	柑桔類	2. 斜紋夜蛾 (Spodoptera litura) 無尾鳳蝶 (Papilio demoleus libanius) 楊桃鳥羽蛾 (Diacrotricha fasciola) 瘤尺蠖蛾 (Ascotis selenaria cretacea) 黃刺蛾 (Cnidocampa flavescens) 3. 象鼻蟲類 臺灣三月始灰象鼻蟲 (Sympezomias cribricollis) 捲葉象鼻蟲 (Euops indigenus)			
		椽果、酪梨、百香果、荔枝、龍眼、獼猴桃、楊梅				
		楊桃、桑、葡萄、火龍果				
椽果或桃	葉蟬類任選 1 種	山茶科作物	葉蟬類： 褐葉蟬 (Idioscopus nitidulus) 綠葉蟬 (Idioscopus clypealis) 桃葉蟬 (Empoasca shinshana) 茶小綠葉蟬 (Jacobiasca formosana) 棗葉蟬 (Quadria pakistanica)			
		咖啡、可可				
		柑桔類				
		葡萄、蓮霧、番石榴				
梨、柑桔類、番石榴或棗(台灣蜜棗、印度棗)任選 1 種	蚜蟲類任選 1 種	椽果、桃、棗(台灣蜜棗、印度棗)、梅、李、紅棗	1. 蚜蟲類： 捲葉蚜 (Aphis citricola) 桃蚜 (Myzus persicae) 棉蚜 (Aphis gossypii) 大桔蚜 (Toxoptera citricidus) 小橘蚜 (茶蚜) (Toxoptera aurantii) 蘋果蚜 (Aphis pomi) 烏白蚜 (Toxoptera odinae) 無眼瘤大蚜 (Nippolachnus piri)			
		山茶科作物				
		薔薇科果樹及棗(台灣蜜棗、印度棗)				
		柑桔類				
		椽果、香蕉、木瓜、番荔枝、百香果、檳榔、黃金果、榴槤蜜				
		蓮霧、番石榴、無花果				

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
			無患子科作物	桃粉蚜 (<i>Hyalopterus pruni</i>) 香蕉蚜蟲 (<i>Pentalonia nigronervosa</i>)		
			山茶科作物、可可、咖啡	2.椿象類 黃斑黑椿(<i>Erthesina fullo</i>) 稻綠椿(<i>Nezara viridula</i>) 矜椿(<i>Rhynchocoris humeralis</i>) 茶角盲椿象 (<i>Helopeltis fasciaticollis</i>) 奎寧角盲椿象 (<i>H. cinchonae</i>) 荔枝椿象(<i>Tessaratoma papillosa</i>)		
	梨	梨瘤蚜 (<i>Aphanostigma iakusuiense</i>)	蘋果、桃	梨瘤蚜 (<i>Aphanostigma iakusuiense</i>)		
	柑桔類或番石榴	粉蝨類任選 1 種	柿	粉蝨類：		
			木瓜、番荔枝	刺粉蝨 (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>)		
			番石榴、桑、無花果	螺旋粉蝨 (<i>Aleurodicus dispersus</i>)		
			柑桔類	菸草粉蝨 (<i>Bemisia tabaci</i>)		
			山茶科作物	番石榴黑疣粉蝨 (<i>Aleurotuberculatus guyavae</i>) 棉絮粉蝨 (<i>Aleurothrixus floccosus</i>) 懸鉤子頸粉蝨(<i>Aleurotrachelus rubi</i>) 茶摺粉蝨 (<i>Aleurotrachelus camelliae</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
4.果樹	柑桔類、番荔枝、香蕉、鳳梨、蓮霧、番石榴任選 1 種	粉介殼蟲類任選 1 種	柑桔類	粉介殼蟲類： 太平洋臀紋粉介殼蟲 (<i>Planococcus minor</i>) 桔粉介殼蟲 (<i>Planococcus citri</i>) 球粉介殼蟲 (<i>Nipaecoccus filamentosus</i>) 知本松粉介殼蟲 (<i>Crisicoccus chiponensis</i>) 桑粉介殼蟲 (<i>Maconellicoccus hirsutus</i>) 香蕉粉介殼蟲 (鳳梨嫡粉介殼蟲) (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) 木瓜秀粉介殼蟲 (<i>Paracoccus marginatus</i>) 傑克貝爾長尾粉介殼蟲 (<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>)		
			薔薇科果樹、棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗及柿			
			葡萄、桑、楊梅			
檬果、番荔枝、香蕉、鳳梨、酪梨、紅龍果、百香果、木瓜、黃金果、榴槤蜜、波羅蜜						
蓮霧、番石榴、楊桃、檳榔 (諾麗果)、無花果、獼猴桃						
山茶科作物						
咖啡、可可						
	梨、棗(台灣蜜棗、印度棗)、柑桔類、檬果任選 1 種	盾介殼蟲類任選 1 種	同上粉介殼蟲類			
	梨、棗(台灣蜜棗、印度棗)、柑桔類、檬果任選 1 種	盾介殼蟲類任選 1 種	薔薇科果樹、棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗及柿 檬果、香蕉、木瓜、酪梨、荔枝、龍眼、椰子、番荔枝、獼猴桃、檳榔、波羅蜜 葡萄、蓮霧、番石榴、楊桃、無花果、楊梅 柑桔類	1. 盾介殼蟲類： 褐圓盾介殼蟲 (<i>Chrysomphalus aonidum</i>) 梨齒盾介殼蟲 (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) 桑擬輪盾介殼蟲 (梨圓介殼蟲) (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) 黑點介殼蟲 (<i>Parlatoria zizyphi</i>) 黃點介殼蟲 (<i>Parlatoria pergantii</i>) 山茶圓介殼蟲 (<i>Pseudaonidia duplex</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
			山茶科作物	淡圓介殼蟲 (<i>Aspidiotus destructor</i>) 椽果白介殼蟲 (<i>Amlacaspis mangiferae</i>) 椽果赤圓介殼蟲 (<i>Aonidiella aurantii</i>) 木瓜赤圓介殼蟲 (<i>Aonidiella inornata</i>) 椰子橢圓盾介殼蟲 (<i>Hemiberlesia lataniae</i>) 牡蠣介殼蟲		
			咖啡	2. 軟介殼蟲類： 咖啡硬介殼蟲 (<i>Saissetia coffeae</i>) 紅臘介殼蟲 (<i>Ceroplastes rubens</i>) 角臘介殼蟲 (<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i>) 綠介殼蟲 (<i>Coccus viridis</i>) 黃綠棉介殼蟲 (<i>Chloropulvinaria psidii</i>)		
	荔枝	膠蟲 (<i>Kerria lacca</i>)	椽果、番荔枝、荔枝、龍眼、愛玉 棗(台灣蜜棗、印度棗)	膠蟲 (<i>Kerria lacca</i>)		
	梨	中國梨木蝨 (<i>Cacopsylla chinensis</i>)	梨 柑桔類 椽果、龍眼 桑	木蝨類： 椽果木蝨 (<i>Microceropsylla nigra</i>) 黔梨木蝨 (<i>Cacopsylla qianli</i>) 柑桔木蝨 (<i>Diaphorina citri</i>) 桑木蝨 (<i>Paurocephala psylloptera</i>)		
	蓮霧或番石榴	大避債蛾 (<i>Eumeta japonica</i>)	蓮霧、番石榴、楊梅 薔薇科果樹、棗(台灣蜜棗、印度棗)、柿 椽果、檳榔	避債蛾類： 大避債蛾 (<i>Eumeta japonica</i>) 茶避債蛾 (<i>Eumeta minuscula</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
			柑桔類 山茶科作物			
	檬果、番荔枝、葡萄、蓮霧任選 1 種	薊馬類	檬果、番荔枝、香蕉、木瓜、酪梨、百香果、紅龍果 柑桔類 葡萄、蓮霧、番石榴、楊桃 薔薇科果樹、柿、棗(台灣蜜棗、印度棗)及紅棗 山茶科作物、無患子科作物	薊馬類： 小黃薊馬 (<i>Scirtothrips dorsalis</i>) 臺灣花薊馬 (<i>Frankliniella intonsa</i>) 花薊馬 (<i>Thrips hawaiiensis</i>) 蔥薊馬 (<i>Thrips tabaci</i>) 腹鉤薊馬 (<i>Rhipiphorothrips cruentatus</i>) 南黃薊馬 (<i>Thrips palmi</i>) 花色薊馬 (<i>Thrips coloratus</i>) 赤帶薊馬 (<i>Selenothrips rubrocinctus</i>) 變葉木薊馬 (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)		
	梨或木瓜或棗(台灣蜜棗、印度棗)或番荔枝或檬果或柑桔類任選 1 種	二點葉蟎 (<i>Tetranychus urticae</i>) 或神澤氏葉蟎 (<i>Tetranychus kanzawai</i>) 或赤葉蟎 (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) 或柑桔葉蟎 (<i>Panonychus citri</i>) 任選 1 種	薔薇科果樹、柿、棗(台灣蜜棗、印度棗) 桑、紅龍果、無花果 柑桔類 檬果、番荔枝、香蕉、荔枝、龍眼、酪梨 木瓜、葡萄、蓮霧、番石榴、楊桃、百香果 山茶科作物、咖啡	1. 葉蟎類： 神澤氏葉蟎 (<i>Tetranychus kanzawai</i>) 偽二點葉蟎 (<i>Tetranychus truncatus</i>) 二點葉蟎 (<i>Tetranychus urticae</i>) 皮氏葉蟎 (<i>Tetranychus piercei</i>) 赤葉蟎 (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) 柑桔葉蟎 (<i>Panonychus citri</i>) 路易氏始葉蟎 (<i>Eotetranychus lewisi</i>) 荔枝葉蟎 (<i>Oligonychus litchi</i>) 2. 偽葉蟎類： 紫紅偽葉蟎 (<i>Brevipalpus phoenicis</i>) 卵圓偽葉蟎 (<i>Brevipalpus obovatus</i>) 加州偽葉蟎 (<i>Brevipalpus californicus</i>)		
	荔枝	荔枝節蟎 (<i>Eriophyes litchi</i>)	龍眼	荔枝節蟎 (<i>Eriophyes litchi</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
	柑桔類、茶任選 1 種	柑桔銹蟎(<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)、茶桔黃銹蟎(<i>Acaphylla steinwedeni</i>)	葡萄、桑、番石榴、破布子 山茶科作物、咖啡	紫銹蟎 (<i>Calacarus carinatus</i>) 桔黃銹蟎 (<i>Acaphylla steinwedeni</i>) 破布子癭蟎 (<i>Eriophyes cordiae</i>)		
	果樹	果實蠅類 (Tephritid)	果樹	果實蠅類 (Tephritid)		
5.特用作物	茶	捲葉蛾類或避債蛾類任選 1 種	山茶科作物	1. 捲葉蛾類： 茶捲葉蛾 (<i>Homona magnanima</i>) 姬捲葉蛾 (<i>Adoxophyes sp.</i>) 黑姬捲葉蛾 (<i>Cydia leucostoma</i>) 2. 避債蛾類： 大避債蛾 (<i>Eumeta japonica</i>) 臺灣避債蛾 (<i>Eumeta oolona</i>) 白腳小避債蛾 (<i>Acanthopsyche (Eumetisa) taiwana</i>) 等； 3. 毒蛾類： 臺灣黃毒蛾 (<i>Euproctis taiwana</i>) 小白紋毒蛾 (<i>Orgyia postica</i>) 4. 燈蛾類 (Artiidae) 5. 尺蠖類 (<i>Biston marginata, Ascotis selenaria</i>) 6. 斜紋夜蛾 (<i>Spodoptera litura</i>) 茶蠶 (<i>Andraca bipunctata</i>)、 黑點刺蛾 (<i>Thosea sinensis</i>) 褐邊綠刺蛾 (<i>Latoia consocia</i>) 銀灰帶刺蛾 (<i>Narosoideus vulpinus</i>)		
	茶	薊馬類	檬果、番荔枝、香蕉、木瓜、 酪梨、百香果、紅龍果 柑桔類	薊馬類： 小黃薊馬 (<i>Scirtothrips dorsalis</i>) 腹鉤薊馬 (<i>Rhipiphorothrips cruentatus</i>) 臺灣花薊馬 (<i>Frankliniella intonsa</i>)		

作物群組	代表使用範圍		可延伸使用範圍		注意事項	備註
	代表作物	代表害物	作物 (註 1)	同群組害物		
			葡萄、蓮霧、番石榴、楊桃	花薊馬 (<i>Thrips hawaiiensis</i>) 蔥薊馬 (<i>Thrips tabaci</i>) 南黃薊馬 (<i>Thrips palmi</i>) 花色薊馬 (<i>Thrips coloratus</i>) 赤帶薊馬 (<i>Selenothrips rubrocinctus</i>) 變葉木薊馬 (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)		
			薔薇科果樹、柿、棗(台灣蜜棗、印度棗)及紅棗			
			山茶科作物			
	茶	茶葉蟎 (<i>Oligonychus coffeae</i>)、神澤氏葉蟎 (<i>Tetranychus kanzawai</i>)、側多食細蟎 (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) 任選 1 種	山茶科作物 咖啡	1. 葉蟎類： 神澤氏葉蟎 (<i>Tetranychus kanzawai</i>) 錫蘭偽葉蟎 (<i>Brevipalpus obovatus</i>) 茶葉蟎 (<i>Oligonychus coffeae</i>) 2. 節蟎類： 紫銹蟎 (<i>Calacarus carinatus</i>) 桔黃銹蟎 (<i>Acaphylla steinwedeni</i>) 3. 側多食細蟎 (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)		
6.花卉	花卉或蔬菜任選 1 種	害蟲或害蟎	花卉	與代表害物相同之害蟲或害蟎		
7.林木	林木或果樹任選 1 種	害蟲或害蟎	林木	與代表害物相同之害蟲或害蟎		
8.菇	洋菇或相同栽培方式之菇類任選 1 種	害蟲或害蟎	相同栽培方式之菇類	與代表害物同種或同類之害蟲或害蟎		
		雙翅目昆蟲 (Diptera)	床式栽培菇類、太空包/瓶式栽培菇類	蕈蠅、癭蠅、蚤蠅、菇蚋之成蟲及蛆或偽毛蟲類		
		蟎 (Mites)	床式栽培菇類、太空包/瓶式栽培菇類	蟎 (Mites)		
		跳蟲 (<i>Isotomurus</i> sp.)	床式栽培菇類、太空包/瓶式栽培菇類	紫跳蟲 (<i>Hypostrura</i> sp.)		

註 1：各科作物種類請參照附表一註 2。

附表三 微生物農藥殺菌劑藥效試驗作物分群表

施用部位	微生物農藥種類 (註 1)	生物特性	作物群組	參考害物及其學名	可延伸使用範圍 (註 2)	
地下部	細菌類/真菌類	根部/真菌性 病害	蔬菜類	1. 白絹病 (<i>Athelia rolfsii</i> , 無性世代: <i>Sclerotium rolfsii</i>)	同屬病原菌及 同作物群組之 寄主作物	
			花卉類	2. 菌核病 (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)		
			果樹類	3. 立枯病 (<i>Rhizoctonia solani</i>)		
			林木類	4. 苗枯病 (<i>Aspergillus flavus</i>)		
			茶	5. 疫病 (<i>Phytophthora</i> spp.)		
			禾本科	6. 猝倒病 (<i>Pythium</i> spp.)		
			水田作物	7. 褐根病、立枯病 (<i>Phellinus</i> spp.)		
				8. 萎凋病 (<i>Fusarium</i> spp.)		
				9. 蔓枯病 (<i>Didymella bryoniae</i>)		
				10. 黑點根腐病 (<i>Monosporascus cannonballus</i>)		
		根部/細菌性 病害	蔬菜類	1. 細菌性軟腐病 (<i>Erwinia</i> spp.)		同屬病原菌及 同作物群組之 寄主作物
			花卉類	2. 青枯病 (<i>Ralstonia</i> spp.)		
			果樹類	3. 細菌性萎凋病 (<i>Burkholderia</i> spp.)		
			林木類	4. 馬鈴薯輪腐病 (<i>Clavibacter</i> spp.)		
茶	5. 黑腐病 (<i>Xanthomonas</i> spp.)					
禾本科						
水田作物						
地上部	細菌類/真菌類	莖、葉、果實 /真菌性病害	蔬菜類	1. 葉枯病、葉斑病 (<i>Cochliobolus</i> spp., 無性世代: <i>Bipolaris</i> spp.)	同屬病原菌及 同作物群組之 寄主作物	
			花卉類	2. 銹病 (<i>Puccinia</i> spp.)		
			果樹類	3. 紋枯病 (<i>Thanatephorus cucumeris</i> , 無性世代: <i>Rhizoctonia solani</i>)		

施用部位	微生物農藥種類 (註 1)	生物特性	作物群組	參考害物及其學名	可延伸使用範圍 (註 2)	
			林木類	4. 白銹病 (<i>Albugo</i> spp.)		
			茶	5. 黑斑病或紫斑病或葉斑病或早疫病(<i>Alternaria</i> spp.)		
			禾本科	6. 炭疽病、葡萄晚腐病、茶赤葉枯病 (<i>Colletotrichum</i> spp.)		
			水田作物	7. 灰黴病 (<i>Botrytis</i> spp., 有性世代: <i>Botryotinia</i> spp.)		
				8. 蘆筍莖枯病 (<i>Phoma asparagi</i>)		
				9. 黑星病 (<i>Venturia</i> spp.)		
			10. 香蕉及柑桔黑星病菌 (<i>Guignardia</i> spp.)			
			蔬菜類	1. 露菌病 (<i>Peronosporaceae</i>)		同科病原菌及 同作物群組之 寄主作物
			花卉類	2. 白粉病 (<i>Erysiphaceae</i>)		
			果樹類			
		林木類				
		茶				
		禾本科				
		莖、葉、果實 /細菌性病害	蔬菜類	1. 白葉枯病、細菌性條斑病 (<i>Xanthomonas</i> spp.)	同屬病原菌及 同作物群組之 寄主作物	
			花卉類	2. 細菌性斑點病 (<i>Xanthomonas</i> spp.)、(<i>Acidovorax</i> spp.)、 (<i>Pseudomonas</i> spp.)		
果樹類	3. 潰瘍病 (<i>Xanthomonas</i> spp.)					
林木類	4. 黑斑病 (<i>Xanthomonas</i> spp.)					
茶	5. 玫瑰癌腫病 (<i>Agrobacterium</i> spp.)					
禾本科						
水田作物						

註 1：(1)微生物農藥種類應為野生菌種，經基因改造或人工誘變改良者，另個案評估。

(2)以相同菌種之產品為原則，微生物菌種分類地位至少需為種級，若可分類至亞種之菌種，則以亞種為代表，如蘇力菌之 Bt k 或 Bt a。

微生物農藥登記標明之菌系，為產品延伸使用範圍評估要件之一，需提供相關佐證資料。

- 註 2：(1)延伸使用範圍跨害物群組或作物群組者均需提供有效性佐證資料。
- (2)佐證資料之害物可為同作物群組不同作物別之半田間或田間之試驗報告或科學佐證報告。
- (3)蔬菜類可另延伸至花卉類、果樹類可另延伸至林木類。

附表四 微生物農藥殺蟲劑藥效試驗作物分群表

施用部位	微生物農藥種類 (註 1)	作物群組	害物群組 (註 2)	代表害物	可延伸使用範圍 (註 3)
地上部	細菌類	蔬菜類	小菜蛾 (<i>Plutella xylostella</i>) 粉蝶類 (Pieridae) 擬尺蠖 (<i>Trichoplusia ni</i>) 菜心螟 (<i>Hellulla undalis</i>) 大菜螟 (<i>Crocidolomia binotalis</i>)	同群組害物任選一種	相同害物群組及 同作物群組
		蔬菜類	夜蛾類 (Noctuidae)	同群組害物任選一種	
		果樹類	毒蛾類 (Lymantriidae)		
		茶	尺蛾類 (Geometridae)		
		禾本科	燈蛾類 (Arctiidae)		
		水田作物			
		蔬菜類	捲葉蛾類 (Tortricidae)	同群組害物任選一種	
		果樹類	葉潛蛾類 (Phyllocnisidae)		
		茶	螟蛾類 (Pyralididae)		
		禾本科	細蛾類 (Gracillariidae)		
		水田作物			
		花卉類	害蟲	同群組或蔬菜類害物任選一種	
		林木類	害蟲	同群組或果樹類害物任選一種	
	申請害物之寄主作物	金花蟲類 (Chrysomelidae) 象鼻蟲類 (Curculionoidea)	同群組害物任選一種	相同害物及其寄 主作物	
真菌類	蔬菜類	鱗翅目幼蟲 (Lepidoptera larvae)	鱗翅目幼蟲任選一種	相同害物群組及 同作物群組	
		鞘翅目幼蟲及成蟲 (Coleoptera)	鞘翅目幼蟲及成蟲任選一種		
		粉蝨類 (Aleyrodidae)	粉蝨類任選一種		

施用部位	微生物農藥種類 (註 1)	作物群組	害物群組 (註 2)	代表害物	可延伸使用範圍 (註 3)
		果樹類	葉蟬類 (Cicadellidae)	葉蟬類任選一種	
			椿象類 (Pentatomidae)	椿象類任選一種	
		茶	蚜蟲類 (Aphidoidea)	蚜蟲類任選一種	
			木蝨類 (Psyllidae)	木蝨類任選一種	
		禾本科	粉蝨類 (Aleyrodidae)	粉蝨類任選一種	
			飛蝨類 (Delphacidae)	飛蝨類任選一種	
		水田作物	介殼蟲類 (Coccoidea)	介殼蟲類任選一種	
			薊馬類 (Thripidae)	薊馬類任選一種	
		花卉類	害蟲	同群組或蔬菜類害物任選一種	
		林木類	害蟲	同群組或果樹類害物任選一種	
地下部	真菌類	申請害物之寄主作物	鱗翅目幼蟲 (Lepidoptera larvae)	鱗翅目幼蟲任選一種	相同害物及其寄 主作物
			鞘翅目幼蟲及成蟲 (Coleoptera)	鞘翅目幼蟲及成蟲任選一種	

註 1：(1)微生物農藥種類應為野生菌種，經基因改造或人工誘變改良者，另個案評估。

(2)以相同菌種之產品為原則，微生物菌種分類地位至少需為種級，若可分類至亞種之菌種，則以亞種為代表，如蘇力菌之 Bt k 或 Bt a。

微生物農藥登記標明之菌系，為產品延伸使用範圍評估要件之一，需提供相關佐證資料。

註 2：同欄位表示同害物群組。

註 3：(1)延伸使用範圍跨害物群組或作物群組者均需提供有效性佐證資料。

(2)佐證資料之害物可為同作物群組不同作物別的半田間或田間之試驗報告或科學佐證報告。

(3)蔬菜類可另延伸至花卉類、果樹類可另延伸至林木類。

附表五 除草劑藥效試驗作物分群表

作物群組	代表作物	可延伸作物	注意事項	備註
1.水稻	水稻	蕙苡(水田移植栽培)、茭白、水芋	對闊葉雜草具選擇性防治效果之藥劑，不適合於水芋田使用。	
2.雜糧	落花生或大豆	大豆(毛豆)、落花生、紅豆、綠豆	施用時期及方法的訂定應考量紅豆較落花生對藥劑敏感。	
	玉米或高粱	高粱、玉米、蕙苡(旱田直播栽培)、小麥		
3.蔬菜	甘藷或馬鈴薯	馬鈴薯、甘藷、胡蘿蔔、山藥、牛蒡、旱芋		
	甘藍	結球白菜、花椰菜、紅鳳菜		
	蒜或青蔥	青蔥、蒜、韭等蔥科作物、金針、百合		
	洋香瓜或西瓜	西瓜、洋香瓜、香瓜、冬瓜、南瓜、隼人瓜		
	胡瓜	苦瓜、絲瓜、扁蒲等搭棚架栽培之葫蘆科蔬菜		
	豌豆	菜豆、扁豆、萊豆等搭棚架栽培之豆科蔬菜	豌豆較菜豆對藥劑敏感。	
	番茄或甜椒	甜椒、番茄、茄子、辣椒等茄科蔬菜		
	不結球白菜	蕓菜、菠菜、萵苣、茼蒿等直播蔬菜		
4.果樹	柑桔類、棗(台灣蜜棗、印度棗)	棗(台灣蜜棗、印度棗)、柑桔類、檬果、楊桃、蓮霧、番石榴、番荔枝、荔枝、龍眼、枇杷、紅棗	1. 僅適用於土壤殘效短於一個栽培季(約4個月)之萌後非選擇性藥劑。 2. 注意避免引起後作敏感作物之藥害及顧及生態保育。	
	梨、葡萄	葡萄、梨、柿、梅、蘋果、桃、李		

附表六 農藥殘留量試驗作物分群表

序號	作物群組	代表作物	可延伸使用範圍		備註
			作物名 (括號內為農產品名、加底線者為進口作物、灰底者為無安全性評估資料(暫保留))		
1	米類	水稻	米類	水稻、陸稻等	
2	麥糧類	玉米、高粱、小麥任選1種	麥糧類	玉米、高粱、小米、小麥、燕麥、 <u>大麥</u> 、 <u>薏苡(薏仁)</u> 、 <u>黑麥</u> 、 <u>黑小麥</u> 、 <u>非洲小米</u> 、 <u>珍珠粟</u> 、 <u>黍稷</u> 、 <u>非洲蘆粟</u> 、 <u>加那利子</u> 、 <u>菰米</u> 、 <u>畫眉草籽</u> 、蕎麥、藜麥、莧米、台灣藜等	
3	乾豆類	大豆或落花生	乾豆類	<u>大豆(註1)</u> 、落花生(花生)、紅豆、綠豆、花豆、樹豆、豇豆、乾燥蠶豆、 <u>黎豆</u> 、油菜(油菜籽)、芥菜(芥菜子)、油茶(油茶子)、亞麻(亞麻子)、胡麻(芝麻)、紅花(紅花子)、向日葵(葵花子)、蓮(蓮子)、棉花(棉花籽)等	
			芽菜類	大豆芽(黃豆芽)、苜蓿芽、綠豆芽、紅豆芽、豌豆芽、落花生芽等	
4	包葉菜類	結球白菜、甘藍、花椰菜、青花菜、結球萵苣任選1種	包葉菜類	結球白菜、 <u>甘藍(註2)</u> 、花椰菜、青花菜、包心芥菜、大心芥菜、瑞典蕪菁、印度芥菜、結球萵苣、朝鮮薊等	
5	小葉菜類	芥藍、萵苣、茼蒿、菠菜、蕪菁、芹菜、葉用甘藷、小白菜、青江菜、蔥、蒜、韭任選1種(註3)	小葉菜類	芥藍、芥菜、薺菜、油菜、不結球白菜(註4)、甘藍菜苗、葉用蘿蔔、苦芥菜、羽衣甘藍、西洋菜、不結球及半結球萵苣(註5)、茼蒿、紅鳳菜、白鳳菜、昭和草(山茼蒿)、芳香萬壽菊、闊包菊、艾草、咸豐草、 <u>大波斯菊</u> 、 <u>螞蟥菊</u> 、 <u>霍香薊</u> 、 <u>王爺葵</u> 、 <u>婆羅門參(洋牛蒡葉)</u> 、雷公根、明日葉、茴香、芹菜、水芹、山芹菜、芫荽、小飛揚草、樹薯葉、刺五加、芋(芋頭葉)、麻蕒、小麥草、香茅草、狼尾草、蘆薈、葉用豌豆、食茱萸、 <u>荖藤(荖葉)</u> 、 <u>龍葵</u> 、枸杞(枸杞葉)、印度羅勒(七層塔)、山菠菜、益母草、薄荷、羅勒(九層塔)、紫蘇、仙草、綠蘭菜(土人參)、馬齒莧、羊萵苣、蕪菁、甘藷(葉用甘藷)、青箱、莧菜、石蓮、糯米糰(糯米菜)、當歸(葉用當歸)、番杏、黃花蘭、香椿、洛葵(皇宮菜)、藤三七(川七)、細本山葡萄、隼人瓜(龍鬚菜)、木鱉果(木鱉果葉)、南瓜(南瓜葉)、滿江紅、龍骨辦苔菜(野蓮、水蓮)、苧麻、過溝菜蕨、國王菜、赤道櫻草、菠菜、蒸菜(葉用甜菜)、金線連、山蘇、台灣藜(葉用台灣藜)等	

序號	作物群組	代表作物	可延伸使用範圍		備註
			作物名 (括號內為農產品名、加底線者為進口作物、灰底者為無安全性評估資料(暫保留))		
				蔥(註6)、蒜、韭(韭菜、韭黃、韭菜花)、薤(落蕎)等(註7)	
			芽菜類	芥藍菜芽、青花菜芽、蘿蔔菜芽等	
6	果菜類	番茄、甜椒、茄子任選1種	果菜類	番茄、甜椒、茄子、辣椒、枸杞、野茄、香瓜茄、酸漿、樹番茄、百合(百合花)、金針、玉米(玉米筍)、蓮(蓮花、蓮子)、洛神葵、秋葵、穗花山奈(野薑花)、玫瑰(玫瑰花)、蘭(蘭花)、曇花、茉莉花等	
7	瓜類	胡瓜(小黃瓜)、苦瓜、洋香瓜、香瓜、西瓜任選1種(註8)	瓜類	胡瓜(小黃瓜)、苦瓜、絲瓜、扁蒲、冬瓜、南瓜、夏南瓜、隼人瓜、越瓜、洋香瓜(含波斯瓜)、香瓜、西瓜、木鱉果(去籽木鱉果)(註9)等	
8	豆菜類	大豆、豌豆、菜豆、豇豆任選1種	豆菜類	大豆(毛豆)(註1)、豌豆、菜豆(粉豆、醜豆、四季豆、敏豆、海軍豆)、菜豆、豇豆(豇豆、長豇豆)、蠶豆、扁豆、翼豆、花豆、鷹嘴豆、草豌豆、樹豆、刀豆等	
			芽菜類	大豆芽(黃豆芽)、苜蓿芽、綠豆芽、紅豆芽、豌豆芽、落花生芽、蘿蔔菜芽、小麥芽、蕎麥芽等	
9	根莖菜類	胡蘿蔔、蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、蘆筍、甘藷任選1種	根莖菜類	蘿蔔(註10)、球莖甘藍、山葵、瑞典蕪菁、莖萵苣、洋蔥(註11)、蒜(蒜頭)、珠蔥(紅蔥頭)、薤(落蕎)、樹薯、麥門冬、蘆筍、芋、山藥、劍筍、茭白(茭白筍)、竹(竹筍)、百合(百合鱗莖)、金針(碧玉筍)、通天草(狗尾草根)、闊葉大豆(闊葉大豆根、一條根)、黃耆、豆薯、蓮蕉(食用美人蕉)、馬鈴薯、丹參、黨蔘、甘藷、荸薺、山防風、牛蒡、蓮(蓮藕)、慈菇、薑、薑黃、刺蜜薯、當歸、胡蘿蔔、甜菜(甜菜根)、菱角等	
10	菇蕈類	同群組作物種類任選1種	菇蕈類	香菇、木耳、金針菇(金菇)、白木耳、草菇、洋菇、珊瑚菇、鮑魚菇、杏鮑菇、秀珍菇、猴頭菇、柳松菇、雪菇、巴西磨菇、靈芝等	
11	柑桔類	桶柑、椪柑、海梨柑、茂谷柑、柳橙、臍橙、檸檬	柑桔類	柑桔(註12)、檸檬(註13)、葡萄柚、柚子(註14)等	

序號	作物群組	代表作物	可延伸使用範圍		備註
			作物名 (括號內為農產品名、加底線者為進口作物、灰底者為無安全性評估資料(暫保留))		
		檬任選1種			
12	梨果類	梨、蘋果、棗(台灣蜜棗、印度棗)、柿任選1種	梨果類	梨、蘋果、 桃(註15) 、梅(青梅、白梅、春梅)、李、杏、 櫻桃(註16) 、枇杷、山楂、榲桲、棗(台灣蜜棗、印度棗)、紅棗、黑棗、柿(柿子)等	
13	其他皮不可食水果	檬果、香蕉、木瓜、番荔枝、荔枝等任選1種	其他皮不可食水果	星蘋果、加蜜蛋黃果(黃金果)、人心果、蛋黃果、榴槤、紅龍果(火龍果)、石榴、百香果、羅望子、欖仁、香蕉、愛玉、麵包果、榴槤蜜、波羅蜜、檳榔、椰子、木瓜、番荔枝(釋迦、鳳梨釋迦)、荔枝、龍眼、紅毛丹、檬果(芒果)、鳳梨、酪梨、山竹、獼猴桃(奇異果)等	
14	其他皮可食水果	草莓、葡萄、蓮霧、番石榴、楊桃任選1種(註17)	其他皮可食水果	西非山欖(神秘果)、 <u>接骨木漿果</u> 、橄欖、楊梅、藍莓、歐洲越橘、 <u>蔓越莓</u> 、西印度櫻桃、金殼果、番石榴(芭樂)、嘉寶果、蓮霧、臺灣天仙果、桑(桑椹)、無花果、檫樹(諾麗果)、海棗、破布子、葡萄、黃酸棗、楊桃、海葡萄、黑醋栗、醋栗、草莓、野草莓、玫瑰果、木莓(覆盆子、黑莓)、大花假虎刺(納塔爾青梅)等	
15	茶類	茶、薄荷、仙草(註18)		茶(茶葉)、八角茴香、板藍根、山葵、魚腥草、刺五加、石菖蒲、桂花、茉莉(茉莉花)、地黃、檸檬香茅、冬青(冬青葉、馬黛茶)、百合(百合花)、黃精、肉豆蔻、頭花香苦草(白有骨消)、黃耆、決明(決明子)、羅望子、甘草、車前草、寬筋藤、芸香、咖哩葉、裂葉月見草、黑白胡椒、黃水茄、到手香、荊芥(貓草)、半支蓮、黃芩、丹參、牛膝草、檸檬香蜂草、鼠尾草、薄荷、馬鬱蘭、迷迭香、百里香、薰衣草、仙草、牛至、番石榴(芭樂心葉)、臺灣天仙果、蛇麻(啤酒花)、桑(桑葉)、桔梗、黨蔘、白花蛇舌草、車葉草、鴨舌癩、馬鞭草、紫珠、馬蹄金、紫茉莉、紫草、菊(註19)、風茹、艾蒿、甜菊、酢漿草、絞股藍、鳳尾蕨、月桂(月桂葉)、肉桂、蓮(蓮花、蓮子心)、澤瀉、洛神葵、磨盤草、蚌蘭、白鶴靈芝、砂仁、白豆蔻、草豆蔻、玫瑰(玫瑰花)、雷公根、高氏柴胡、甜沒藥、歐芹、雪維菜、芹菜(甜芹、芹菜子)、水芹、小茴香、球莖茴香、當歸、圓葉當歸、蒔蘿(蒔蘿子)、金線連、馬利筋等	

序號	作物群組	代表作物	可延伸使用範圍		備註
			作物名 (括號內為農產品名、加底線者為進口作物、灰底者為無安全性評估資料(暫保留))		
16	甘蔗	甘蔗		甘蔗等	
17	堅果類	栗、杏仁	堅果類	松子、 <u>澳洲胡桃(夏威夷果)</u> 、 <u>山胡桃</u> 、 <u>胡桃</u> 、 <u>栗子</u> 、 <u>阿月渾子(開心果)</u> 、 <u>腰果</u> 、 <u>銀杏</u> 、 <u>榛果</u> 、 <u>杏(杏仁)</u> 等	
18	咖啡	咖啡		咖啡、可可、 <u>可樂(可樂果)</u> 等	

註1：「大豆」有乾豆類及豆菜類農產品，乾豆類包含黃豆、黑豆等不同品種，農產品名統稱為大豆；豆菜類包含毛豆、茶豆等不同品種，農產品名統稱為毛豆。

註2：「甘藍」含甘藍、抱子甘藍、球莖甘藍、捲曲甘藍

註3：延伸至非蔥科小葉菜類主要作物，應提供2場次以上非蔥科小葉菜類代表作物試驗

註4：「不結球白菜」含小白菜、青江菜、廣島菜、日本油菜

註5：「不結球及半結球萵苣」含葉萵苣、本島萵苣、蘿蔓、福山萵苣、蘿蔓萵苣、歐洲菊苣、彩葉萵苣

註6：「蔥」含蔥、麥蔥、珠蔥、蝦夷蔥

註7：延伸至蔥科小葉菜類主要作物，應至少提供1場次蔥科小葉菜類代表作物試驗

註8：由洋香瓜、西瓜、香瓜、苦瓜為代表作物時，限延伸至胡瓜(小黃瓜)開花前使用

註9：「木鱉果」食用部位為果肉及其假種皮(指種子紅色外皮，種子本身有微毒不宜食用)，增列農產品名為去籽木鱉果，取食類別屬瓜菜類。

註10：「蘿蔔」含蘿蔔、黑蘿蔔

註11：「洋蔥」含洋蔥、威爾士洋蔥、樹蔥、銀皮洋蔥

註12：「柑桔」含桶柑、椪柑、海梨柑、茂谷柑、柳橙(柳丁)、晚崙西亞、臍橙、蜜橘、苦橙、血橙、酸橙、葉橙、明尼桔柚、金桔、金柑

註13：「檸檬」含檸檬、臺灣香檬、萊姆

註14：「柚子」含柚子、文旦柚、白柚、西施柚

註15：「桃」含桃、油桃、蟠桃

註16：「櫻桃」含黑櫻桃、酸櫻桃、歐洲甜櫻桃、蘇里南櫻桃

註17：由蓮霧、番石榴、楊桃為代表作物時，限延伸至草莓及葡萄開花前使用

註18：由薄荷、仙草為代表作物時，限延伸至香辛植物及其他草本植物

註19：「菊」含紫錐菊、杭菊、金盞花