

一、小菜蛾性費洛蒙

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
小菜蛾性費洛蒙		(1)(Z)-11-hexadecenal (2)(Z)-11-hexadecenyl acetate (3)(Z)-11-hexadecenol

90.5%小菜蛾性費洛蒙 VP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
十字花科 包葉菜類、十字花 科小葉菜類、十字花 科根菜類	小菜蛾	每公頃誘餌 數量 120 個					每 8-12 公尺設置 1 個 性費洛蒙誘蟲器，每橡 皮帽內含費洛蒙 0.45mg；將誘餌放置於 黏膠式誘蟲器內，黏板 黏滿小菜蛾蟲體時需 及時更換；誘蟲盒懸掛 高度為作物生長點上 方 30-50 公分處。		田間有效期 為 2 個月。		興農股份 有限公司

二、液化澱粉芽孢桿菌 CL3

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
液化澱粉芽孢桿菌 CL3	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> CL3	Bacillus amyloliquefaciens CL3

1×10⁸ cfu/ml 以上 液化澱粉芽孢桿菌 CL3 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
草莓	灰黴病	2.5 公升	400	發病初期時 開始施藥	7	連續 3 次					興農股份 有限公司
蔬菜	灰黴病	0.6-7.5 公 升	400	發病初期時 開始施藥	7	連續 3 次				延伸使用	
花木	灰黴病	0.6-7.5 公 升	400	發病初期時 開始施藥	7	連續 3 次				延伸使用	限觀賞花 卉使用，使 用前宜先 進行小面 積藥害測 試。

三、賽氟菲克利

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
賽氟菲克利	thi fluzamide+hexaconazole	(1)2',6'-dibromo-2-methyl-4'-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide (2)(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol

15. 25%賽氟菲克利 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	紋枯病	0.67-0.8 公斤	1,500	於水稻分 蘗期及孕 穗期各施 藥1次。				15			台灣日產 化工股份 有限公司