

一、亞汰尼

200 G/L(20% W/V)亞汰尼 FS

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
水稻	葉稻熱病	每公斤稻種混拌 10 毫升藥劑和 5 毫升水					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。</li> <li>2. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用於水稻種子處理。</li> <li>2. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridiam® EC 104) 2 毫升。</li> </ol>		

二、芬普尼

250 G/L (25% W/V) 芬普尼 FS

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	二化螟蟲	每公斤稻種混拌 6 毫升藥劑與 9 毫升水。					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。</li> <li>2. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用於水稻種子處理。</li> <li>2. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridiam® EC 104) 2 毫升。</li> </ol>		

三、平氟芬

240 G/L (24% W/V)平氟芬 FS

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
水稻	紋枯病	每公斤稻種混拌8毫升藥劑與7毫升水。					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。</li> <li>2. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用於水稻種子處理。</li> <li>2. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridiam® EC 104) 2 毫升。</li> </ol>		

四、二福隆

480G/L(48%W/V)二福隆 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
十字花科 包葉菜類	鱗翅目害 蟲	0.25 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥	7	連續 2 次		22			惠光股份 有限公司

五、液化澱粉芽孢桿菌 PMB01

$1 \times 10^9$  cfu/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 AL

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
胡瓜	萎凋病		200	發病初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液	7	共 5 次					嘉農企業股份有限公司
蔬菜	萎凋病	4-36 公升	200	發病初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液	7	共 5 次				延伸使用	
花木	萎凋病	4-36 公升	200	發病初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液	7	共 5 次				延伸使用	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。

六、賽氟滅

21%賽氟滅 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	苗立枯病	0.33 毫升/ 每育苗箱	1,500				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 育苗箱於播種後澆灌藥液，再行覆土。</li> <li>2. 每育苗箱施用 500 毫升稀釋液。</li> </ol>		適用於水稻育苗箱		台灣日產 化工股份 有限公司

七、速殺氟

21.8%速殺氟 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
瓜菜類、瓜 果類、龍鬚 菜	粉蟲類	0.25-0.5 公升	2,400	害蟲發生 時開始施 藥	7	最多 2 次		6			台灣道禮 股份有限 公司

八、氟派瑞

400 G/L (40% W/V) 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
番茄	根瘤線蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第3天澆灌稀釋藥液1次，每株澆灌40毫升，或每公頃澆灌800公升藥液。					施用前保持土壤濕潤		台灣拜耳股份有限公司

九、福賽得

80%福賽得 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
百香果	疫病	1.6-3.2公 斤	500	雨季來臨 前開始施 藥	10	共3次		21		延伸使用	