

一、液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Ba-BPD1	Bacillus amyloliquefaciens Ba-BPD1

1×10<sup>9</sup> cfu/ml 以上 液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
草莓	灰黴病	3.34 公升	300	萼片出現病徵時開始施藥	7	連續 4 次			1. 本藥劑為微生物製劑，建議於黃昏或陰天噴施。 2. 本藥劑應單獨使用。		台灣肥料股份有限公司
蔬菜	灰黴病	0.8-6.6 公升	300	發病初期開始施藥	7	連續 4 次			1. 本藥劑為微生物製劑，建議於黃昏或陰天噴施。 2. 本藥劑應單獨使用。	延伸使用	
花木	灰黴病	0.8-6.6 公升	300	發病初期開始施藥	7	連續 4 次			1. 限觀賞花卉使用。	延伸使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
									2. 本藥劑為微生物製劑，建議於黃昏或陰天噴施。 3. 本藥劑應單獨使用。		